

Alcon®

# アイゾプト®懸濁性点眼液1% を使用される方へ

この点眼液は、  
緑内障または高眼圧症を治療するお薬です。

白～微黄白色の  
にごった点眼液



オレンジ色の  
キャップ

点眼後、一時的に目がかすむことがあります。しばらくすると元に戻ります。



# 点眼方法

1

点眼前にはよく手を洗ってください。



2

キャップを閉じたままよく振ってください。

保存中にお薬が沈殿してしまう場合があるので、よく振ってからご使用ください。



3

容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように1滴点眼してください。

点眼液に細菌などが入るのを防ぐため、容器の先端を目から離してください。



4

点眼後は目を閉じて、目頭を  
1～5分程度軽く押さえてください。

点眼液が鼻などに流れ込むのを  
防ぐため、目頭のあたりを指で  
押さえるようにしてください。



5

目のまわりやまつ毛についた  
お薬はふき取ってください。

目のかすみなどを防ぐために、  
清潔なティッシュなどで軽く  
ふき取ってください。



## 上手に1滴点眼するコツ

この点眼液は、容器の横を押すと点眼できます(図1)。  
また、容器のおしり部分(底部)を1回押しても1滴出ます(図2)。




図1




図2


## 使用上の注意

### 点眼時

- 1回1滴、1日2回または3回点眼します。主治医に指示された点眼方法に必ず従ってください。
- ソフトコンタクトレンズをつけている場合は、レンズを外してから点眼し、15分以上経ってからレンズをつけてください。
- 他の点眼液も使用している場合は、10分以上あけて点眼してください。

### 開封後

- キャップはしっかりと閉めてください。
- 高温や直射日光を避けて、1~30℃で保存してください。
- 開封後4週間経った場合は、残りの点眼液は使用しないでください。



### その他

- 点眼後、目がかすむ、目がごろごろする、苦味を感じるなどの気になる症状がある場合は、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転は注意してください。
- その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。