

Alcon®

デュオトラバ®配合点眼液 を使用される方へ

デュオトラバ®は、
緑内障または高眼圧症を治療するお薬です。
2つの薬(プロスタグランジン(PG)製剤とベータ遮断薬)が
配合されており、
それぞれの作用で眼圧を下げます。



点眼方法

1 手を洗う

点眼前は手をきれいに洗ってください。



2 容器を目から離して点眼

点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

※点眼液に細菌などが入るのを防ぐため



3 目頭を軽く押さえる

点眼後は目を閉じて、目頭を1～5分程度軽く押さえてください。

※点眼液が鼻などに流れ込むのを防ぐため



点眼時の注意

点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

これらを軽減するために

- 1 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやタオルでふき取ってください。



- 2 目を閉じて、あふれた薬液を洗い流してください。



副作用について


以下のような症状があらわれることがありますが、その場合はすぐに主治医の診察を受けてください。

- 目の異物感、眼痛
- 息切れ、息苦しい、息をするとゼーゼーヒューヒュー鳴る
- 呼吸困難、意識障害、立ちくらみ
- 全身倦怠感、発熱、皮膚に赤い斑点ができ日光で悪化する

その他、点眼により、目のまわりが黒ずむ、まつ毛が長くなる・太くなる、瞳の色が濃くなる、目が赤くなる・しみる・かゆい・刺激を感じる・かすむ、脈が遅くなる、頭が痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

開封前(未使用のもの)

保存袋に入れ、高温や直射日光を避けて、室温(1~30℃)で保存してください。



開封後(使い始めてから)

- キャップはしっかりと閉めてください。
- 保存袋に入れ、高温や直射日光を避けて、室温(1~30℃)で保存してください。
- 開封後1カ月を経過した場合は、残りの点眼液を使用しないでください。

その他

- 点眼後、目が赤くなることがありますが、そのような症状が続く場合は主治医にご相談ください。
※多くの場合、点眼を継続すると症状は軽減しますので、ご自身の判断で点眼を中止しないでください。
- 1回1滴、1日1回の点眼です。1日1回を超えて使用しないでください。
- 他の点眼液も使用している場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

製造販売元(輸入元)(資料請求先)

Alcon® 日本アルコン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7

PML008

DUO-10・05E-1-1,150SM
2010年5月 作成