

トラバタンス[®]点眼液0.004% を使用される方へ



点眼方法

- 1** 点眼前には手をきれいに洗ってください。



- 2** 点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

点眼液に細菌などが入るのを防ぐため、容器の先端を目から離し、1滴点眼してください。

- 3** 点眼後は目を閉じて、目頭を1～5分程度軽く押さえてください。

点眼液が鼻などに流れ込むのを防ぐため、目頭のあたりを指で押さえるようにしてください。



点眼時の注意

●点眼後の注意点

点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

これらを軽減するために



- 1 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやタオルでふき取ってください。
- 2 目を閉じて、あふれた薬液を洗い流してください。



●点眼のタイミング

日常生活では、次のタイミングで点眼するのもよい方法です。



洗顔する
前に



お化粧を落とす
前に



お風呂に入る
前に




保存上の注意



開封前（未使用のもの）

- 保存袋に入れて、1～25℃で保存してください。
（冷蔵庫での保存も可能です。）




開封後（使い始めてから）

- キャップはしっかりと閉めてください。
- 高温や直射日光を避けて保存してください。
- 保存袋に入れて、室温で保存してもかまいません。
（冷蔵庫での保存も可能です。）
- 開封後4週間経過した場合は、残りの点眼液を使わないでください。



外出時にも携帯できます。



車内や窓際など高温になる場所には放置しないでください。

トラバタンズ[®]点眼液0.004%を使用される方へ 使用上の注意

- 1回1滴、1日1回の点眼です。1日1回を超えて使用しないでください。
 - 他の点眼液も使用している場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。
-
- 点眼後、目が赤くなる場合がありますが、そのような症状が続く場合は医師にご相談ください。
※多くの場合、点眼を継続すると症状は軽減しますので、ご自身の判断で点眼を中止しないでください。
 - 点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
 - 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
 - その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

製造販売元(輸入元)

Alcon[®] 日本アルコン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7